


DM n°2*Etude d'une couverture cintrée*

La figure ci-contre représente un système de couverture cintrée suivant un arc de cercle. L'objet de l'étude est de déterminer le rayon R de cet arc de cercle en fonction de la hauteur x (ou flèche) choisie. La largeur de la structure est fixée à 400 cm et sa hauteur x doit être comprise entre 100 cm et 300 cm.




$$AB = 400 \text{ cm}$$

$$100 \text{ cm} < x < 300 \text{ cm}$$

I. Étude de deux cas particuliers

Dans cette partie, on suppose que la flèche est plus petite que le rayon.

Le profil est alors schématisé dans le dessin ci-contre.



1. Le rayon de cintrage R étant fixé à 250 cm, calculer OH puis HK.

2. La hauteur étant fixée à $x = 120$ cm, on veut calculer le rayon de cintrage R . Pour cela:

a) En considérant la droite (OK), exprimer OH en fonction de R .

b) En utilisant le triangle rectangle OBH, montrer que :

$$R^2 = (R - 120)^2 + 40000 \quad (1)$$

c) Résoudre l'équation (1) pour calculer R . Le résultat sera arrondi au dixième

II. Étude du cas général

On admet que le rayon de cintrage R est donné en fonction de la flèche x par la relation :

$$R = \frac{40000 + x^2}{2x}$$

1. On considère la fonction f définie sur l'intervalle $[100 ; 300]$ par $f(x) = \frac{40000 + x^2}{2x}$

a) Montrer que $f(x)$ peut s'écrire sous la forme : $f(x) = \frac{20000}{x} + \frac{x}{2}$

b) Calculer la dérivée f' de la fonction f .

Montrer que $f'(x)$ peut s'écrire sous la forme $f'(x) = \frac{x^2 - 40000}{2x^2}$

Dans l'intervalle $[100 ; 300]$, déterminer la valeur de x pour laquelle $f'(x) = 0$.

c) En déduire le tableau de variations de f .

d) Tracer la représentation graphique de la fonction f dans un repère orthonormal

2. Pour quelle valeur de x le rayon R est-il minimal ?